

園で出席停止になる病気について

令和4年4月6日 発行

※ 感染症の再受診のため遅れる場合は、9時までに連絡を入れてください。体調不良の際には登園は控えてください。受信後に登園を希望の方は、症状によってお休みしていただく場合もありますので、事前にご相談ください。

※ 流行性の感染症について（インフルエンザ、感染症胃腸炎等）
・ ご家族が流行性の感染症にかかっている場合は、感染の拡大を防ぐため（小さいお子さんが重篤な症状を引き起こす可能性がある）、お子さんの登園は極力控えていただきますようお願いいたします。

【第1類（法定伝染病）】

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎（ポリオ）、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウィルスに限る）、中東呼吸器症候群（MERS コロナウィルス）、鳥インフルエンザ（H5N1）、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

【第2類（届出伝染病）】

病名	症状	潜伏期間	登園のめやす
インフルエンザ	・高熱（3～4日ほど続く） ・激しい咳、のどの痛み、頭痛、鼻水、関節の痛み、筋肉痛 ・下痢や嘔吐を伴うことがある	1～4日	・症状が出た日から5日以内に症状が無くなった場合は、症状が始まった日から7日目。または熱が下がってから、3日を経過するまで。
百日咳	・くしゃみや咳、鼻水 ・コンコンと激しい咳 ・息を吸う時に、ヒューという特有の音になる	7～10日	・特有の咳がなくなり、全身状態が良くなってから。
麻疹 （はしか）	・高熱、咳、鼻水 ・ほおの内側に出る白い斑点 ・全身に出る赤く細かい発しん	8～12日	・熱が下がってから3日を経過してから。
流行性耳下腺炎 （おたふく風邪）	・高熱 ・片方、または両側の耳下腺のはれと痛み	16～18日	・耳下腺のはれと痛みが消失してから。
風しん	・高熱、耳の後ろのリンパのはれ、目の充血 ・発熱と同時に、胸や顔などから赤くかゆみを伴う発しんが全身に広がる ・3～5日で発しんが消える	16～18日	・発しんが消失してから。
水とう （水ぼうそう）	・37～38度の微熱 ・かゆみの強い赤い発しんが、胴体から全身に、頭部までに広がる ・赤い発しんが水泡になり、赤黒いかさぶたになっていく	14～16日	・すべての発しんがかさぶたになってから。
咽頭結膜炎 （プール熱）	・38度以上の高熱 ・のどのはれと痛み ・目の充血やまぶたの裏の赤み ・目やにや涙	5～7日	・発熱や充血などの症状が治まってから2日経過するまで。
結核および侵襲性髄膜炎菌感染症	・高熱 ・激しい咳（たんがからんだような咳が3～4日続く） ・呼吸が荒くなる ・呼吸困難やチアノーゼを起こすこともある ・下痢や嘔吐を伴うこともある	2年以内	・感染のおそれがなくなってから。

【第3類】

病名	症状	潜伏期間	登園のめやす
コレラ	<ul style="list-style-type: none"> ・水様性の激しい下痢 ・嘔吐 	1～3日	<ul style="list-style-type: none"> ・感染のおそれが無くなってから。
細菌性赤痢	<ul style="list-style-type: none"> ・全身の倦怠感 ・悪寒を伴う急激な発熱 ・水様性の下痢 ・腹痛、しぶり原、膿粘血便 	1～3日	<ul style="list-style-type: none"> ・感染のおそれが無くなってから。
腸管出血性大腸菌感染症 (O157・O26・O111等)	<ul style="list-style-type: none"> ・激しい腹痛 ・嘔吐や水のような激しい下痢 ・血便 ・脱水やけいれん 	3～8日	<ul style="list-style-type: none"> ・症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間以上をあげて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されてから。
腸チフス	<ul style="list-style-type: none"> ・高熱(胸や背中、腹の淡いピンク色の発しん) ・頭痛 ・全身のだるさ ・便秘 	2週間前後	<ul style="list-style-type: none"> ・感染のおそれが無くなってから。
パラチフス	<ul style="list-style-type: none"> ・高熱 ・下痢または便秘 	2週間前後	<ul style="list-style-type: none"> ・感染のおそれが無くなってから。
流行性角結膜炎 (はやり目)	<ul style="list-style-type: none"> ・目の充血、目やに ・まぶたのはれ ・発熱や下痢を起こすこともある 	5～12日	<ul style="list-style-type: none"> ・感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してから。
急性出血性結膜炎	<ul style="list-style-type: none"> ・強い目の痛み ・目の結膜(白眼の部分)の充血、目やに 	1～3日	<ul style="list-style-type: none"> ・感染のおそれが無くなってから。
B型肝炎	<ul style="list-style-type: none"> ・肝機能の低下 ・発熱やだるさ、嘔吐、食欲不振 ・諸症状の後に黄疸が出る 	45～160日	<ul style="list-style-type: none"> ・急性肝炎の極期を過ぎてから。
日本脳炎	<ul style="list-style-type: none"> ・高熱 ・けいれんやひきつけ ・頭痛や嘔吐 ・手足のまひ ・ぐったりする、ぼーっとする 	2～15日	<ul style="list-style-type: none"> ・症状が回復した後。
溶連菌感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・高熱 ・のどの痛みとはれ ・全身に広がるかゆみのある発しん ・いちご舌 ・吐き気やリンパ節のはれ 	2～5日	<ul style="list-style-type: none"> ・抗菌薬内服後24～48時間経過してから。
マイコプラズマ肺炎	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱 ・しつこい咳 ・気管支炎や肺炎を合併することもある 	2～3週間	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱や激しい咳が治まってから。
手足口病	<ul style="list-style-type: none"> ・手のひら、足の裏、口の中、おしり等にできる、赤い発しんや米粒大の水疱 ・発熱、下痢、嘔吐を伴うこともある 	手足や口腔内に水疱、潰瘍が発症した数日間	<ul style="list-style-type: none"> ・熱が下がってから一日以上経過し、口腔内の水疱、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれてから。
伝染性紅斑 (りんご病)	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱から2～3週間後、ほおにできる赤い発しん ・腕や足、おしりに網目状の発しんが出ることもある ・発しんはかゆみを伴うこともある 	4～14日	<ul style="list-style-type: none"> ・全身状態が良くなってから。

ノロウイルス感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・突然の嘔吐、下痢 	12～48時間	<ul style="list-style-type: none"> ・嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれてから。
ロタウイルス感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・突然の嘔吐、下痢 ・白色の便 	1～3日	<ul style="list-style-type: none"> ・嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれてから。
アデノウイルス感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱（高熱の場合もある） ・のどの痛み ・目の充血、目やに ・腹痛、下痢、嘔吐 	5～7日	<ul style="list-style-type: none"> ・熱が下がってから2日以上経過し、すべての症状がなくなってから。
ヘルパンギーナ	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱 ・のどの奥にできる小さな水泡 ・4～5日ほどで熱とのどの痛みは治まる 	急性期の数日間 （便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要）	<ul style="list-style-type: none"> ・熱が下がってから1日以上経過し、口腔内の水泡、潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれてから。
RSウイルス感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・鼻水、咳 ・高熱 ・ぜいぜいという呼吸音 ・悪化すると呼吸困難になる 	呼吸器症状のある間	<ul style="list-style-type: none"> ・呼吸器症状が消失し、全身状態が良くなってから。
帯状疱疹	<ul style="list-style-type: none"> ・赤いぶつぶつとした発しん、水ぶくれ ・皮膚の痛み、かゆみ ・身体の片側のみ発しん 	水泡を形成している間	<ul style="list-style-type: none"> ・すべての発しんがかさぶたになってから。
突発性発しん	<ul style="list-style-type: none"> ・高熱 ・熱が下がる頃に出る、顔や胸、お腹の赤い発しん 	9～10日	<ul style="list-style-type: none"> ・熱が下がってから1日以上経過し、機嫌がよく全身状態が良くなってから。
ヒトメタニューモウイルス感染症	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱 ・激しい咳、鼻水 ・ゼイゼイ（ヒューヒュー）いう呼吸 ・悪化すると呼吸困難になる 	3～5日	<ul style="list-style-type: none"> ・咳などの症状がおさまり、全身状態が良くなってから。

※ 出席停止になる感染症は、上記のものばかりではありません。感染症と診断されましたら、ご相談ください。